



Váš nejlepší přítel si zaslouží tu nejlepší péči.

Je-li váš pes v rizikové skupině pro výskyt rakoviny, jsou každoroční screeniny pro detekci lymfomu nezbytné.

Rakovina je hlavní příčinou smrti u dospělých psů. A lymfom je jedním z nejčastějších typů rakoviny.¹ Pokud je tedy váš pes v rizikové skupině výskytu rakoviny*, včetně lymfomu, je důležité mít se na pozoru a každoročně absolvovat screening rakoviny jako součást pravidelné preventivní prohlídky vašeho mazlíčka. Protože když rakovinu odhalíme včas, můžeme s ní i včas bojovat.

Všechna plemena psů



Vysoce riziková plemena



Detekce lymfomu.

Jedním z nejčastějších typů rakoviny u psů je lymfom – rakovina krve postihující lymfatický systém. Viditelné příznaky se mohou lišit. Někteří psi nevykazují žádné příznaky, zatímco na jiných můžeme pozorovat úbytek hmotnosti, zvracení, průjem, nové bulky na těle nebo potíže s dýcháním. Lymfom může u psů rychle postupovat, často dokonce bez viditelných příznaků, dokud není příliš pozdě. Proto je důležité pravidelně provádět screening na výskyt lymfomu. Díky pravidelným screeningovým prohlídkám máme větší šanci odhalit lymfom včas.

Jednoduchý test krve s mimořádnými možnostmi.

Detekce rakoviny ušla dlouhou cestu. Na základě prvotních údajů dokáže test IDEXX Cancer Dx™ detekovat lymfom z jediného vzorku krve, a to i u psů, kteří nevykazují žádné klinické příznaky.² Pokud je tedy váš pes v rizikové skupině výskytu lymfomu, zeptejte se svého veterináře na pravidelné screeningové prohlídky.

Preventivní prohlídka začíná plánem.

Jak poznáte, že je váš pes v rizikové skupině výskytu rakoviny? Jakmile váš pes dosáhne věku 7 let, jsou pravidelná screeningová vyšetření nezbytnou součástí jeho zdraví. Ale u některých plemen by se se screeningovým vyšetřením mělo začít již ve 4 letech. Zeptejte se svého veterináře na to, jaké je riziko vzniku rakoviny u vašeho psa a následně společně vytvořte plán zdravotní péče, který bude vyhovovat vašim potřebám.

Následující plemena mají vyšší riziko výskytu rakoviny:

Zlatý retrívr
Francouzský buldoček
Bígl
Boxer
Malý knírač
Bernský salašnický pes
Flat-coated retrívr

Skotský teriér
Bullmastiff
Labradorský retrívr
Rotvajler
Dobrmán
Anglický buldok

Jedná-li se o rakovinu, tak je negativní výsledek dobrý výsledek.

Stejně jako lidé, i psi s rizikem rakoviny by měli podstupovat pravidelná screeningová vyšetření. A i když se většina testů vrátí s negativním výsledkem, tak nejlepším způsobem, jak lymfom odhalit včas, je pravidelné screeningové vyšetření. Negativní výsledek výskytu lymfomu nezaručuje, že se u vašeho psa v budoucnu lymfom nebo jiný typ rakoviny nevyvine.

Co očekávat od pozitivního výsledku.

Pokud jsou výsledky testů vašeho psa pozitivní na lymfom, může vám veterinář doporučit opakovanou kontrolu za 4–8 týdnů nebo další vyšetření v závislosti na příznacích. U potvrzených případů výskytu lymfomu by další kroky mohly zahrnovat doporučení ke specialistovi nebo projednání možností léčby, jako je chemoterapie, radioterapie, chirurgický zákrok nebo paliativní péče. Mnoho psů chemoterapii snáší dobře a po celou dobu léčby si udržují dobrou kvalitu života.^{3,4} Pravidelné prohlídky jsou klíčem k zajištění včasné a přesné péče.

Nejlepší dar, který můžete dát svému psovi? Stáří.

Screening rakoviny je jen malou součástí plánu zdravotní péče o psa. Spolu s dietou, cvičením, pravidelnými screeningovými prohlídkami a milující rodinou můžete vy a váš veterinář pomoci vašemu psovi žít dlouhý a zdravý život.

Chcete se dozvědět více? Navštivte stránky wearethecure.org a fetchacure.org.

Zeptejte se svého veterináře na screening pro detekci lymfomu.

IDEXX

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092
USA

*Mezi rizikové psy patří všichni psi od věku 7 let a vysoce riziková plemena od věku 4 let.

Literatura

1. Jaké jsou nejčastější typy rakoviny u psů? Kolik psů obvykle onemocní rakovinou? Veterinary Cancer Society; 2021. Accessed February 3, 2025. www.vetcancersociety.org/pet-owners/faqs
2. Data on file at IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA: Data based on testing performed at IDEXX Reference Laboratories in North America between November 1, 2024, and December 6, 2024. Analytická zpráva: *Validate IDEXX Cancer Dx, 100282 [008_CancerDx-Validation-Report-2.Rmd]*.
3. Bergmann M, Sauter-Louis C, Hirschberger J. Lebensqualität und Lebenserwartung am malignen Lymphom erkrankter Hunde unter Chemotherapie. Eine Besitzerumfrage [Quality of life and life expectancy of dogs undergoing chemotherapy for malignant lymphoma. An owner survey]. *Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere*. 2011;39(4):229–236.
4. Bianchi ML, Drudi D, Treggiari E, et al. Quality of life assessment in cancer patients receiving single-agent versus multidrug chemotherapy protocols. *Open Vet J*. 2021;11(4):755–763. doi:10.5455/OVJ.2021.v11.i4.28

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena. • 09-2692500-00
Všechny značky ®/TM jsou majetkem společnosti IDEXX Laboratories, Inc., nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. Zásady ochrany osobních údajů společnosti IDEXX jsou k dispozici na stránce idexx.com.

