


Krok 3: Léčba CKD



1. stadium

Doporučení týkající se léčby

Obezřetně používat nefrotoxické léky

Korigovat prerenální a postrenální abnormality

Dávat zvířeti k dispozici dostatečné množství čerstvé vody

Sledovat trend vývoje hodnot kreatininu a SDMA pro zhodnocení stability nebo progresu onemocnění


Snažit se odhalit a léčit vyvolávající příčinu

Léčit hypertenzi, pokud je systolický tlak krve trvale >160 nebo je přítomno poškození cílového orgánu

Léčit přetrvávající proteinurii terapeutickou ledvinovou dietou a medikací (UPC >0,5 u psů; UPC >0,4 u koček)

Udržovat hladinu fosforu < 4,6 mg/dl (<1,5 mmol/l)

Pokud je to třeba nasadit terapeutickou ledvinovou dietu a přípravky vázající fosfor




2. stadium

Stejně jako v 1. stadiu

Terapeutická ledvinová dieta

Léčba hypokalemie u koček



3. stadium

Stejně jako ve 2. stadiu

Udržovat fosfor <5,0 mg/dL (<1,6 mmol/L)


Léčit metabolickou acidózu

Zvážit léčbu anémie

Léčit zvracení, inapetenci a nevolnost

K udržení hydratace může být nutné zvýšené enterální nebo subkutánní podání tekutin

U psů zvažte léčbu kalcitriolem



4. stadium

Stejně jako ve 3. stadiu

Udržujte fosfor < 6,0 mg/dL (<1,9 mmol/L)

Zvažte zavedení sondy zajišťující výživu a hydrataci a usnadňující podávání léků